

THUỐC CHỦNG SÀI UỐN VÁN VÀ BẠCH HẦU (Td)

Những điều bạn cần biết trước khi bạn hoặc con của bạn được chủng



VỀ CÁC CHỨNG BỆNH NÀY

Sài uốn ván (cứng hàm) và bạch hầu là các chứng bệnh hiếm nghèo. Sài uốn ván là do vi trùng xâm nhập cơ thể qua chỗ bị dứt da hoặc vết thương.

Bạch hầu lan truyền khi vi trùng lây từ người bị nhiễm trùng sang mũi hoặc cổ họng những người khác.

Sài uốn ván làm cho:
tất cả các khớp cơ bị giật co thắt trầm trọng và đau đớn

Bạch hầu gây ra:
một mảng phù dày trong mũi, cổ họng, hoặc khí quản

Bệnh này có thể dẫn đến:
- quai hàm bị "khóa cứng" làm cho bệnh nhân không thể mở miệng hoặc nuốt được

Bệnh này có thể dẫn đến:
- các khó khăn về hô hấp
- tim ngưng hoạt động
- tê liệt
- thiệt mạng

VỀ THUỐC CHỦNG

Các lợi điểm của thuốc chủng

Chủng ngừa là phương cách hay nhất để bảo vệ chống lại sài uốn ván và bạch hầu. Nhờ có chủng ngừa cho nên ngày nay trường hợp mắc phải các chứng bệnh này ít xảy ra hơn nhiều. Trẻ em nay hiếm khi bị mắc các bệnh này vì đa số các em đều được chủng ngừa DTP (Bạch hầu, Sài Uốn Ván, và bệnh Ho Gà), DTaP (Bạch hầu, Sài Uốn Ván, và bệnh Ho Gà vô tế bào), hoặc DT (Bạch Hầu và Sài Uốn Ván). Nếu chúng ta ngưng chủng ngừa cho mọi người thì át sẽ thấy nhiều trường hợp mắc phải các chứng bệnh này hơn.

Khi nào thì bạn nên chủng ngừa Td?

Thuốc chủng Td được dành cho những người từ 7 tuổi trở lên.

Những người nào trong đời chưa được chủng ít nhất 3 lần về bất cứ loại nào (DTP, DTaP, hoặc DT) để ngừa sài uốn ván và bạch hầu thì nên chủng Td. Sau khi chủng lần thứ ba, cứ mỗi 10 năm một lần cần phải chủng lại Td cho đến trọn đời.

Các loại thuốc chủng khác cũng có thể được dùng cùng lúc với Td.

Cho bác sĩ hoặc y tá của bạn biết nếu người được chủng:

- đã có lần bị phản ứng nghiêm trọng vì dị ứng với thuốc hoặc gặp khó khăn gì khác sau khi được chủng Td, hoặc bất cứ loại thuốc chủng sài uốn ván và bạch hầu nào khác (DTP, DTaP, hoặc DT)
- hiện đang bị bệnh ở mức trung bình hoặc bệnh nặng
- đang mang thai

Nếu bạn không chắc, hãy hỏi bác sĩ hoặc y tá của bạn.

Thuốc chủng Td có thể đưa đến các rủi ro nào?

Nhu bắt cứ loại thuốc men nào, vẫn có các rủi ro dù thật hiếm để có thể đưa đến vấn đề nghiêm trọng, ngay cả chết người được, sau khi được chủng ngừa.

Những rủi ro do thuốc chủng gây ra vẫn **hiếm hơn nhiều** so với các rủi ro do các chứng bệnh này gây ra nếu mọi người ngưng sử dụng thuốc chủng.

Hầu như tất cả những người được chủng ngừa Td đều không gặp vấn đề gì cả.

Các trường hợp khó khăn ở tầm mức nhẹ

Nếu các trường hợp sau đây xảy ra thì thông thường sẽ xảy ra trong vòng vài giờ đến một hoặc hai ngày sau khi được chủng. Các triệu chứng này có thể kéo dài 1-2 ngày:

- nơi được chủng trở nên ê ẩm, tấy đỏ, hoặc sưng lên

Các triệu chứng này có thể nặng hơn ở người lớn chủng ngừaTd thường xuyên quá.

Có thể dùng các loại thuốc Acetaminophen hoặc Ibuprofen (không có chất aspirin) để làm hạ cơn đau nhức.

Các trường hợp khó khăn nghiêm trọng

Những tình trạng này rất hiếm xảy ra:

- bị phản ứng nặng vì dị ứng với thuốc chủng
- đau nhức dữ dội và bắp thịt bị xẹp đi trên (các) bắp tay. Tình trạng này xảy ra từ 2 đến 4 tuần sau khi được chủng, và có thể kéo dài nhiều tháng.



Để (những) nơi chăm sóc y tế có chi tiết chính xác về chủng ngừa, bản thẩm định chủng ngừa, và lịch trình đề nghị chủng ngừa cho tương lai, chi tiết sẽ được gửi cho Michigan Care Improvement Registry (Thư Khố Cải Tiến Chăm Sóc Michigan). Mọi người đều có quyền yêu cầu nơi chăm sóc y tế của họ không gửi chi tiết chủng ngừa cho Thư Khố.

DCH-0471V

AUTH: P.H.S., Act 42, Sect. 2126.